

Cimice asiatica (*Halyomorpha halys*)

Da alcuni anni è presente l'*Halyomorpha halys* (cimice asiatica); tali insetti, non sono pericolosi per l'uomo, ma provocano gravi danni all'agricoltura (frutteti, nocciolati e nelle coltivazioni di peperone e mais).

L'*Halyomorpha halys* si nasconde nelle zone più riparate delle abitazioni per trascorrere il periodo invernale.

La diffusione di questo insetto, che ha origine asiatica, segnalato in Italia per la prima volta nel 2012, è favorita dal fatto che non ha antagonisti naturali e pertanto si riproduce rapidamente.

Per eliminarlo, bisogna tenere presente che la lotta diretta con insetticidi non risulta agevole sia per il fatto che non tutte le sostanze attive risultano efficaci sia per la elevata mobilità degli adulti. E' necessario porre gli insetti catturati in contenitori con acqua e sapone, in modo tale da impedirne la fuga e causarne la rapida eliminazione. Le cimici raccolte vanno comunque eliminate e non solo allontanate!

Di seguito le indicazioni della scheda elaborata dal Servizio Fitosanitario della Regione Piemonte e dalla Fondazione Agrion, disponibile al seguente link:

https://www.agrion.it/wp-content/uploads/2019/03/Vademecum_Cimice_Asiatica.pdf



cimice asiatica (*Halyomorpha halys*)

Differenza con la cimice verde autoctona (*Nezara viridula*)



cimice verde (*Nezara viridula*)